



Nếu đang dùng thuốc Rifampin, quý vị nên biết:

- ◆ nước tiểu, nước bọt, hoặc nước mắt của quý vị có thể chuyển sang màu đỏ vàng.
- ◆ kính áp tròng loại mềm của quý vị có thể bị ố. Hiện tượng này có thể xảy ra **rất nhanh**. Không nên mang kính áp tròng mềm khi đang dùng thuốc rifampin.
- ◆ da của quý vị có thể nhạy cảm hơn với nắng. Mang kính râm và che phần da có thể tiếp xúc với nắng.
- ◆ một số biện pháp ngừa thai **không có tác dụng tốt** trong khi quý vị đang dùng thuốc rifampin. Trong thời gian dùng thuốc này, phụ nữ nên sử dụng một biện pháp ngừa thai dự phòng, thí dụ như bao cao su.

**Bảo vệ bản thân, gia đình
và bạn bè của quý vị
không bị nhiễm lao. Hoàn
tất đây đủ đợt điều trị lao
của quý vị!**

**Nếu quý vị có thắc
mắc, xin liên lạc:**



<http://www.vdh.state.va.us/epi/tb>

[“What You Should Know About
Taking Tuberculosis Medicines”]
Vietnamese

Ngày 8 tháng Mười một, 2002

Những Điều Cần Biết



Khi Dùng Thuốc Chữa Bệnh Lao